Richard A. Munaretto, DDS, MS Raymond F. Munaretto, DDS Rick A. Munaretto, DDS Diplomate, American Board of Endodontics Keith Sommers, DDS Richard A. Kohn, DDS, MS Vladana Babcic, DMD, MPH, MA Michael P. Munaretto, DDS, MS

Instructiones Para Tratamiento Posterior A Una Extración

Muerda firmemente en una gasa por 1½ a 2 horas. Si sangra bastante muerda en un nuevo pedazo de gasa por una hora adicional. Repita de nuevo si es necesario. Una pequeña cantidad de sangre es normal despues de una extracción.

Para que se sane mas rapido: No mastique la gasa. No escupe o se enjuage por las proximas 24 horas, ya que causara que continue sangrando. No tome liquidos por un sorbete (popote) o fume ya que esto causara que comienze a sangrar de nuevo. Necesitamos que se coagule la sangre, toma unas 24 horas que se cuágule completamente. Evite líquidos o

Emergency Telephone Numbers:	
(708) 447-8080	
(630) 209-8528	
(708) 927-1638	
(312) 515-0042	
(630) 920-3418	
(608) 215-5550	
(708) 308-9828	

comida muy calientes (café, té, etc.) o productos con alcohol (whiskey, enjuage bucal) por el día de hoy. Remueva la gasa para comer o beber.

Por el día de hoy coma y beba en el lado opuesto de su boca lo maximo posible. Coma comidas suaves (por ejemplo: huevos, yogurt, o leche) por los proximos dos día para evitar que lastime la area de la extración. (Ejemplo: no nachos o caramelo de mani).

Despues de 24 horas puede comenzar a enjuagarse con agua tibia salada. (Mescle ½ de cucharadita de sal con ½ taza). Mantenga su boca y dientes limpios. Enjuagese después de cada vez que coma.

Es normal y necesario para el proceso de curación que tenga un poco de hinchazón. Si se empieza a hinchar, pongase hielo en la area por diez minutos y quíteselo por diez minutos continuamente por las proximas 24 horas. Si tiene alguna pregunta llame a nuestra oficina.

3116 Oak Park Avenue Berwyn, IL 60402 T: (708) 484-9011 F: (708) 484-9061